

ad. Blach.



VIRO NOBILISSIMO ET CONSULTISSIMO
D. GEORGIO CLIFFORTIO J. V. D.

CAROLI LINNÆI
Doct. Med. & Acad. Imp. Nat. Cur. Soc.
FLORA
LAPPONICA

Exhibens
PLANTAS
Per
LAPPONIAM

*Crescentes, secundum Systema Sexuale
Collectas in Itinere*

Impensis
SOC. REG. LITTER. ET SCIENT. SVEDICÆ
A. MDCCXXXII.

Instituto.

Additis

Synonymis, & Locis Natalibus Omnium,
Descriptionibus & Figuris Rariorum,
Viribus Medicatis & Oeconomicis
Plurimarum.

AMSTELÆDAMI,
Apud SALOMONEM SCHOUTEN,

MDCCXXXVII.

4

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

112. CONVALLARIA *scapo nudo.* *

Majalis

Liliago. Vaill. par. 116.

Lilium convallium album. Bauh. pin. 304.

Lilium convallium, flore albo. Rudd. cat. 25. hort.
65.

Lilium convallium minus. Lind. wikf. 21.

Lilium convallium. Rudd. vult 21. Frank. spec. 18.
Till. ab. 39. ic. 144.

Svalaninöchem. Lappis.

α. In sylvis ad latera australia montium rarius reperitur.

β. Qui genus Convallaræ in classe naturali non coniungit cum *Liliaceis* reliquis, errat: Flos enim sine calice, corolla sexfida, stamina sex, stigma trigonum, pericarpium triloculare, ut de convenientia foliorum florumque in facie externa vel radice carnosâ nihil dicam. Ratio, cur ad *Liliaceos* relata non sit, fuit pericarpium molle seu Bacca, quæ tantum gradu a capsula differt, ut infinita dicuntur exempla, Ex. gr. Amygdalus & Persica, Nicotiana & Atropa, Cucubalus & Behen (§. 180. 2.) &c. Vetteres

Caucasicus 332. *CAREX* spicis plurimis remotis sessilibus subrotundis turpidis.
Cyperoides alpinum, foliis caryophyllatis, spicis brevibus, & nigricante & alido variegata. Scheuch. inlt. 421.

fruticosa 333. *CAREX* spicis remotis sessilibus, capsulis subglobosis.
Gramen cyperoides, foliis caryophyllatis, spica granis rarioribus & tumidioribus conflata. Rudb. clyf. 1. p. 57. t. 31.

Cyperoides foliis caryophyllatis, spicis rarioribus & tumidioribus vesicis compositis. Tournef. inlt. 530.
 a. Inter omnes Carices est hæc species vulgarissima.
 ß. In capsulis, loco seminum, communiter latebat bulbus farinaceus globosus niger, qui morbus etiam in aliis fere omnibus huius generis speciebus observabatur, licet in illis rarus, in hac communis.

flava 334. *CAREX* spicis ad apicem tribus sessilibus, seminibus subrotundis, capsulis acutis recurvis.
Cyperoides palustre aculeatum, capitulo brevior. Tournef. inlt. 529.
Gramen cyperoides aculeatum germanicum vel minus. Bauh. pin. 7.
 a. In sylvis rarius.

diversa 335. *CAREX* spicis remotis, seminibus sessilibus, capsulis bisatis.
Cyperoides polystachyon lanuginosum. Tournef. inlt. 529.
Gramen cyperoides polystachyon lanuginosum. Pluk. phyt. 34. f. 6. Rudb. clyf. 1. p. 55. f. 24.
 a. In Alpibus & desertis communis, copiosius occurrit in Noruegia & Finmarkia.

336.

336. *CAREX* spica masculina & femina, in ala folioli, remota.

a. Abunde in sylvis omnibus invenitur.
 ß. Culmus vix pedalis, tenuissimus, crassitie setæ porcinæ, nudus. Folia tenuia, longitudine fere culmi. Spica masculina fusca scapum terminat. Spica femina sessilis in ala folioli, ipso folio breviori.

337. *CAREX* spicis tribus ad apicem sessilibus, seminibus ovatis atris.

a. In foliis Alpibus nobis visa fuit.
 ß. Facies eadem & statura est, quam (p. 324.); differt tamen ab ea & allis, quod spica oblonga fusca masculina caulem terminet, tum quod duæ femininæ alternæ iuxta apicem culmi collocentur ovatæ, magnæ, & quoad calicem & germina atræ.

338. *CAREX* spica masculina terminatrice, spica femina suprema brevior, capsulis distantibus.

Gramen caryophyllatum montanum, spica varia. Bauh. pin. 4. prod. 23.

Gramen caryophyllatum polycarpon, fractu triangulo. Gottsch. prull. 112.

Cyperoides montanum nemorosum minus, caule triquetro compresso, spicis ferrugineis tenuioribus, inter se distantibus, capsulis variis dispositis oblongis turbinatis trilateris. Mich. gen. 65. tab. 32. fig. 9.
 a. In desertis rarius.

339. *CAREX* spica unica.

Gramen cyperoides spica simpliciter casta. Morif. hist. 3. p. 244. t. 8. f. 12. f. 21. 22.

Cyperoides minimum seminibus reflexis puliciformibus. Dill. giff. 78.

Gramen cyperoides minimum, seminibus deorsum flexis puliciformibus. Raj. syn. 3. p. 424.

R 2

Carex

*globularis**peratilis**rigilata**pulicaris*