

CAROLI LINNÆI

MED. ET BOTAN. PROFESS. UPSAL.

FLORA
SVEVICICA

Exhibens

PLANTAS

PER

REGNUMSVEVICÆCRESCENTES,

SYSTEMATICE

Cum

DIFFÉRENTIIS SPECIERUM
SYNONYMIS AUTORUM
NOMINIBUS INCOLARUM
SOLO LOCORUM
USU PHARMACOPEORUM.

STOCKHOLMIÆ

Sumtu & literis LAURENTII SALVII

1745.

OCTANDRIA.

POPULUS.

819. POPULUS foliis subrotundis dentato - angulatis utrinque glabris. *Hort. cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 82. *Hall. belv.* 156.

Populus foliis orbiculatis crenatis. *Fl. lapp.* p. 300.
Mas.

Populus tremula, *Baub. pin.* 429.

Populus Lybica. *Dod. pempt.* 836.

Populus Lybica, Cercis theophrasti, *Baub. hist.* 1. p. 160.

Succis Asp. Lappis Supp.

Habitat frequens in umrosis succulentis.

820. POPULUS foliis subrotundis dentato - angulatis: subtus tomentosis. *Hort. cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 82. *Hall. belv.* 156.

Mas.

Populus alba, *Dod. pempt.* 835. *Brom. goth.* 89.

Populus alba, majoribus foliis, *Baub. pin.* 429.

Populus alba Leuce, *Baub. hist.* 1. p. 160.

Succis Poppelträd.

Habitat non ubique, sed circa Partbele Gothoburgi copiose, ac unica in platea publica non procul a civitatis porta nova; hinc priscis temporibus aliunde allatam & transplantatam existimat *Brom. goth.* 89.

821. POPULUS foliis deltoideis acuminatis serratis. *Hort. cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 82. *Hall. belv.* 156. *Gron. virg.* 194.

Populus nigra, quae flores non fructum fert. *Cæs. hist.* 120.

Populus nigra. *Baub. pin.* 429. *Dod. pempt.* 836.

Populus nigra sive Aegeros. *Baub. hist.* 1. p. 155.

Succis Flugträd.

Ha-

Habitat passim ad praedia Nobilium in Scania & alibi, forte per culturam, licet clima nunc ferat. *Pharmac. POPULI Oculi, Unguentum.*

ENNEANDRIA.

HYDROCHARIS.

11. HYDROCHARIS. *Hort. cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 10. *Hall. belv.* 301.

Rana morfus altera icon. *Microleuconymphaea, Boerb. lugdb.* 1. p. 282.

Dod. pempt. 583. f. 2. *Nymphaea alba minima, Baub. pin.* 193.

Ranae morfus. *Dod. pempt.* 583. f. 1.

Morfus ranae foliis circinatis, floribus albis, *Tournef. art.* 1705. p. 311. *Dill. gen.* 149.

Stratiotes foliis aloes, femine rotundo. *Raj. syn.* 3. p. 290.

Habitat in fossis, fluxuibus & aquis pigrioribus Uplandia, Dalekarlia, Scaniae.

MERCURIALIS.

823. MERCURIALIS caule simplicissimo, foliis scabris. *Hort. cliff.* 461. *Roy. lugdb.* 203. *Hall. belv.* 195.

Mercurialis montana spicata, *Baub. pin.* 122.

Cynocrambe femina sive Mercurialis repens. *Baub. hist.* 2. p. 978. f. superior.

Cynocrambe femina. *Cam. epit.* 999.

Succis Bingel.

Ha-

POLYGAMIA SUPERFLUA.

ARTEMISIA.

667. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis laciniatis, floribus erectis. *Hort. cliff. 404. Roy. lugdb. 153.*
 Artemisia officinarum, flore purpurascente. *Vaill. act. 1719. p. 378.*
 Artemisia vulgaris major. *Baub. pin. 137. Fl. lapp. 279.*
 caule & flore purpurascens. *Tournef. inst. 460.*
 Artemisia vulgaris. *Baub. hist. 3. p. 184. Ruob. cas. hort. 11. Vall. 4. Till. ab. 5. Lind. wiksb. 4.*
 Artemisia vulgaris major, caule ex viridi albicante. *Tournef. inst. 460.*
 Succis Græbo, Smolandis Græbōna, Dalekarlis Burit, Hellisingis Binka, Babusiis Bōna, Westrogothis Banrot, Habitat in cultis, ruderatis, agris, frequens.
 Pharmac. ARTEMISIAE Herba rubra, Herba alba, Syrupus, Aqua, Sal, Essentia.
668. ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, caule procumbente. *Hort. cliff. 403. Roy. lugdb. 154.*
 Artemisia tenuifolia. *Dod. pempt. 33. Vaill. act. 1719. p. 376.*
 Abrotanum campestre. *Baub. pin. 136. cauliculis rubentibus. Tournef. inst. 459.*
 Ambrosia altera. *Cam. epit. 507.*
 Abrotanum campestre, cauliculis albicantibus. *Tournef. inst. 403.*
 Habitat in campis montosis apricis aridis, præsertim Uplandiæ & Scaniæ frequens.
669. ARTEMISIA foliis pinnatis, ramis ascendentibus hirsutis, floribus globosis pendulis, receptaculo papposo. *Li. goth. jul. 13. cum figur.*
 Artemisia caulibus simplicissimis; foliis pinnatis, laciniis linearibus parallelis; floribus solitariis. *At. stockb. 1741. p. 205.*

Artemisia ex alis florida, foliis petiolatis palmatis planis fericeis. *Hall. belv. 695.*

Absinthium pumilum repens & supinum. *C. B. Pluk. alm. 3. t. 37. f. 1.*

Habitat in insula Carolina majore, solo arido.

Obf. Utrum hæc sit prædicta Halleri, nec non, hæreo; figura Plukenetii quidem hoc suaderet, Dillenius tamen dissuadet. Caules spithamæ vel paulo longiores, villo nitido aspersi, procumbentes fere, ascendunt tempore florescentiæ. Folia pinnata, pinnis linearibus & satis similia foliis Tanacetii foliis pinnatifidis integerrimis. *Hort. cliff. 398.* Flores sub caule penduli, petiolarum, subsolitarium, globosi, majores in hac quam in alia ulla nobis cognita specie hujus generis.

670. ARTEMISIA foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo papposo. *Hort. cliff. 404. Roy. lugdb. 153.*

Absinthium vulgare majus. *Baub. hist. 3. p. 168. Vaill. act. 1719. p. 371.*

Absinthium ponticum seu romanum officinarum f. dioscoridis. *Baub. pin. 138. Tournef. inst. 457.*

Absinthium. *Cam. epit. 452.*

Succis Maldræ, Westrogothis Maleta.

Habitat in ruderatis & ad pagos passim.

Pharmac. ABSINTHII VULGARIS Herba, Cineres, Aqua, Oleum dist. coct. Spiritus, Syrupus, Extractum, Essentia duplex, Conserva, Semina, Sal duplex.

671. ARTEMISIA foliis compositis multifidis tomentosissimis, ramis floriferis nutantibus. *At. stockb. 1741. p. 205.*

Absinthium marinum album. *Ger. hist. 940.*

Absinthium seriphium belgicum. *Baub. pin. 139. Baub. hist. 3. p. 178. Tournef. inst. 458.*

Habitat in littoribus marinis Oelandiæ ad Matkroken, Gotlandiæ ad Grotlingbo, Scaniæ ad Landscronam, Bahusiæ ad Hermansö insulæ Orosi. &c.

Obf. Planta tota nivea; odor Mari sive Camphoræ fortissimus.