

CAROLI LINNÆI

S:R:IGIÆ M:ITIS SVETIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.  
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;  
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.  
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD  
GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,  
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,  
SYNONYMIS SELECTIS,  
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

---

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Poloniæ ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ,  
IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

C. Appelgren

CAROLI LINNÆI

S:R RIGIÆ M:ITIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.  
PROFESS. UPSAL; EQUITIS DE STELLA POLARI;

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITÈ COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,  
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,  
SYNONYMIS SELECTIS,  
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS II.

*Carl. Beckmann*

---

*Cum Privilegio S. R. M:tis Sveciæ & S. R. M:tis Poloniæ ac Electoris Saxon.*

---

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

*C. Appelgren*

- montana. 3. M'NUARTIA floribus lateralibus alternis bractea longioribus. *Læf. epist. VIII: 43.*  
*Habitat in Hispania collibus altis. ☉*

## QUERIA.

- hispanica. 1. QUERIA floribus confertis. *Læf.*  
*Habitat in Hispania. ☉*  
 Antecedente minor, fragilior. Capitulum florum obsoletius tetragonum, facillime a caule discedens. Bractea setacea, erectæ, apice extrorsum hamate, vestibus adhaerentes. Semen 1, compressum, subrotundum. Color planta albidus. Habitus antecedentis & structura floris eadem; at Semina solitaria & plura constitunt genera diversissima.

- canadensis. 2. QUERIA floribus solitariis, caule dichotomo. Mollugo foliis oppositis, stipulis quaternis, caule dichotomo. *Gron. virg. 14?*  
*Habitat in Canada, Virginia. ♀*  
 Radix fibrosa. Caulis strictus, dichotomus, spithameus, teres, filiformis, erectus. Herba lini cathartici. Folia opposita, lanceolata-ovata, integerrima, adperso utrinque punctis fuscis. Stipulae geminae utrinque, acuta, membranacea. Flores solitarii, subpedunculati, parvi, virides, ex singula dichotomia. Calyx quinquepartitus: foliolis obtusiusculis, subformicatis. Petala nulla. Stamina 3, Antheris flavis. Germen subrotundum. Stylis tres. Spontanea planta aliorum caule capillari; culta crassior & foliis minime punctatis.

## LECHEA.

- minor. 1. LECHEA foliis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis. *Gen. nov. 1074.*  
 Captaria foliis integerrimis. *Gron. virg. 75.*  
 Scoparia foliis tenuissimis in plurimos & tenuissimos ramulos divisa & subdivisa. *Raj. suppl. 132.*  
*Habitat in Canadae sylvis glareosis. ♀*
- major. 2. LECHEA foliis ovati-lanceolatis, floribus lateralibus vagis. *Gen. nov. 1074. f. 4.*  
*Habitat in Canadae aridis.*

## Classis IV.

TETRANDRIA  
MONOGYNIA.

## LEUCADENDRON.

1. LEUCADENDRON foliis setaceis, flosculis dissimulatis racemosis. *Protea foliis setaceis, floribus racemosis. Hort. cliff. 496.*  
*Habitat in Ethiopia. ♀*
2. LEUCADENDRON foliis subulatis, ramis determinatis, floribus terminalibus. *Protea foliis linearibus simplicissimis, ramis determinatis, floribus terminalibus. Roy. lugdb. 186.*  
*Habitat ad Caput b. spei. ♀*  
 Folia conferta. Rami ad determinata spatia conferti, ceterum nulli. Calyces subrotundi, pubescentes.
3. LEUCADENDRON foliis subulatis, ramis sparsis, floribus lateralibus. *Lepidocarpodendron foliis angustissimis gramineis, fructu cancellato, semine coronato. Boerb. lugdb. 2. p. 193. t. 193.*  
*Habitat ad Caput b. spei. ♀*
4. LEUCADENDRON foliis lanceolatis, floribus oblongis, calycum squamis summis hirsutis. *Lepidocarpodendron.*  
*Protea foliis lanceolatis integerrimis glabris, calycinis superne villosis. Roy. lugdb. 186.*  
*Lepidocarpodendron foliis angustis longioribus salignis, calycis squamis elegantissime ex flavo fusco albo nigro variegatis, florum plumis atropurpureis. Boerb. lugdb. 2. p. 188. t. 188.*  
 β. *Protea foliis lanceolatis integerrimis glabris, calycem succingentibus hirsutis. Roy. prodr. 188.*  
*Lepidocarpodendron folio saligno viridi: nervo & margine flavo, cono longo superiore parte maxime clauso. Boerb. lugdb. 2. p. 189. t. 189.*  
*Habitat ad Cap. b. spei. ♀*
5. LEUCADENDRON foliis lanceolatis, floribus oblongis, calycum squamis glabris. *Pro-*



Classis. VII.

HEPTANDRIA  
MONOGYNIA.

## TRIENTALIS.

1. TRIENTALIS, foliis lanceolatis integerrimis.  
Trientalis. *Fl. lapp.* 139. *Fl. suec.* 302. *Roy. lugd.* 438.  
Alfines alpina. *Svensck. fies.* 117.  
Pyrola alfinis flore europea. *Baub. pin.* 191. *prodr.* 101.  
Pyrola alfinis flore minor brasiliana. *Baub. prodr.* 101.  
t. (*sub Hermodactyli nomine*) 99. *Burf. X.* 107.  
*Habitat in Europæ borealis sylvis & juniperetis. &*
2. TRIENTALIS foliis subrotundis crenatis. *Roy. lugd.* 538. †  
*Habitat ad Cap. b. Spei.*  
*Plantam hanc non vidi, ex auctoritate Clariff. D. Reyeni, adposui.*

## ÆSCULUS.

- Hippo. Costa.* 1. ÆSCULUS, floribus heptandris. *Hort. upf.* 92.  
*num.* Æsculus. *Hort. cliff.* 142. *Roy. lugd.* 463.  
Castanea folio multido. *Clas. hist.* 1. p. 7.  
*Habitat in Asia septentrionaliore, unde in Europam,*  
1550. b
- Pavia.* 2. ÆSCULUS, floribus octandris.  
Pavia. *Boerb. lugd.* 2. p. 266. t. 265. *Hort. angl.* 54.  
t. 19. *Hort. cliff.* 143. *Roy. lugd.* 463.  
Saamouna pifonis l. filiquitera brasiliensis arbor, digi-  
tatis foliis ferratis, floribus teucriti purpureis. *Pluk.*  
*alm.* 326. t. 56. f. 4.  
*Habitat in Carolina, Brasilia. b.*

Classis. VIII.

OCTANDRIA  
MONOGYNIA.

## TROPÆOLUM.

1. TROPÆOLUM foliis integris, petalis acuminato, se-  
tatis. *Hort. upf.* 93.  
Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. *Hort. cliff.* 145.  
Cardaminum minus & vulgare. *T. Fewill. peruv.* 2.  
p. 14. t. 8.  
Nasturtium indicum majus. *Baub. pin.* 306.  
Nasturtium indicum. *Lob. ic.* 166. f. 2. 1.  
*Habitat in Peru, Lima. ☉ &*
2. TROPÆOLUM foliis subquincquelobis, petalis obtusis. *minus.*  
*Hort. upf.* 93.  
Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. *Hort. cliff.* 143.  
Cardaminum ampliori folio & majori flore. *T. Fewill.*  
*peruv.* 3. p. 14. t. 8.  
Activiola maxima odorata. *Boerb. lugd.* 1. p. 244.  
Viola inodora icandens, nasturtii sapore, maxima odora-  
ta. *Herm. lugd.* 628. t. 629.  
*Habitat in Peru, unde in Europam, venit 1684 cura Be-*  
*weringii. ☉ &*
3. TROPÆOLUM foliis palmatis, petalis multifidis. *peregrinum.*  
Cardaminum quincquelobii folio, vulgo Malla. *Fewill.*  
*peruv.* 2. p. 756. t. 42.  
*Habitat in Peru, nondum mihi visa in Europa. ☉*

## OSBECKIA.

1. OSBECKIA.  
Echinophora maderaspatana, sideritis non ferratis nervo-  
sis foliis, fructu capulari caucalidis æmulo. *Pluk.*  
*alm.* 132. t. 173. f. 4.  
Kadali maderaspatanum minus, capsulis pilosis. *Raj.*  
*suppl. app.* 236.  
*Habitat in India; in honorem Petr. Osbeck, Sveci, qui*  
*1751. plantas Chinae & Javæ periculoso itinere adire, le-*  
*git, examinavit, descripsit, communicavit.*  
*Habitat Melaflome. Caulis erectus, brachiatus, acute tetra-*  
*gonus.*

Clas.

Y 5

*Habitat in Tataria, Persia, &c.*

Habitus *A. campestris*, sed erectus. Caulis paniculatus, subincauus. Folia inferiora pinnato-multifida, linearia, caesentia. Rami virgati, Racemis s. Spicis alternis, secundis, recurvatis, Pedicellis adpersis foliis linearibus, obtusiusculis, recurvis. Flores solitarii, cylindrici; in Planta fructificante omnes Caules erecti, tum amiserunt incanum colorem. Folia in ramis minima, linearia, indivisa.

- campestris.* 4. ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *Hort. cliff.* 403. *Fl. succ.* 668. *Roy. lugd.* 154. *Gmel. sib.* 2. p. 117.

Abrotanum campetere. *Bauh. pin.* 136.

Ambrosia altera. *Cam. epist.* 597.

*Habitat in Europæ campis apricis, aridis. 2*

- palustris.* 5. ARTEMISIA foliis linearibus pinnatis integerrimis, floribus glomeratis subsessilibus.

Artemisia herbacea, foliis multifidis linearibus, corymbis in spica interrupta glomeratis sessilibus. *Gmel. sib.* 2. p. 119. t. 55.

Ambrosia capillacea foliis, flosculis aureis densissime congestis. *Ann. rath.* 197.

*Habitat in Sibiria.*

Caulis procumbentes, adscendentes. Folia Coronopi, linearia, pinnatifida; segmentis 5. f. 7. Flores glomerati, subsessiles, flavi.

- crithmifolia.* 6. ARTEMISIA foliis compositis divaricatis linearibus carnosis glabris, caule adscendente paniculato.

Abrotanum hispanicum maritimum, folio crasso splendente & rigido. *Tournef. inst.* 459.

Abinthium inodorum, foliis crithmi lucidis obscure viridibus. *Morif. hist.* 3. p. 11 *Raj. suppl.* 232.

*Habitat in Lulitania littoribus arenosis, Læsting.*

Habitus *A. campestris*, glaber. Caulis semipedales, fruticulosi, adscendentes, Paniculae florum terminati. Folia pinnatifida trifidaque, linearia, glabra, carnosia. Flores *A. campestris*.

- maritima.* 7. ARTEMISIA foliis multipartitis tomentosis, racemis cernuis, flosculis femineis ternis.

Artemisia foliis compositis multifidis tomentosis, ramis floriferis nutantibus. *Is. ol.* 112. \* *Fl. succ.* 671.

Artemisia foliis compositis multifidis, racemis simplicibus alternis, floribus erectis sessilibus. *Roy. lugd.* 113. *Saw. monsp.* 264.

Abinthium seriphium belgicum. *Bauh. pin.* 139. *Bauh. hist.* 3. p. 178.

- β. Abinthium seriphium germanicum. *Bauh. pin.* 139. *Habitat in Europæ septentrionalioris littoribus maris. 2*

- γ. ARTEMISIA foliis pinnatis, caulibus adscendentibus hirsutis, floribus globosis cernuis; receptaculo pappo-

so. *is. gotl.* 285. t. 285. \* *Fl. succ.* 669.

Artemisia foliis pinnatis pilosis, ramis adscendentibus; floribus oblongis tuberectis. *Gmel. sib.* 2. p. 111. t. 49. t. 1.

Abinthium pumilum repens & supinum. *C. B. Pluk. alm.* 3. t. 37. f. 1.

Abinthium pumilum palmum minus, argenteo sericetisque folio. *Boec. mus.* 2. p. 81. t. 71.

Abinthium alpinum incanum. *Bauh. pin.* 139. *prodr.* 71?

- δ. Abinthium viride, foliis multifidis linearibus. *Gmel. sib.* 2. p. 131. t. 64. f. 2.

*Habitat in Sibiria, Oelandiæ rupibus calcareis.*

Differt *C. B.* (ex *Bursero*) planta ramis longioribus, aliisque forte ex loco notis; Sibirica magis frutescens est. Planta in rupibus alba sericea. In horto major, atroviridis, nuda.

\* *Erectæ herbacæ, foliis compositis.*

9. ARTEMISIA foliis multipartitis subtus tomentosis, pontica, floribus subrotundis nutantibus; receptaculo nudo.

*Hort. upl.* 257. *Hort. cliff.* 404. *Mat. med.* 387.

Abinthium ponticum tenuifolium incanum. *Bauh. pin.* 138.

Abinthium tenuifolium. *Dad. pempt.* 24.

*Habitat in Hungaria interiore, Pannonia, Thracia, My-*

*lia. 2*

10. ARTEMISIA foliis triplicato-pinnatis utrinque glabris, floribus subglobosis nutantibus; receptaculo glabro conico. *Hort. upl.* 257.

Artemisia, radice annua, viridis, foliis pinnatis; pinnis pinnatifidis; calycibus subrotundis fere erectis ex alii copiosissimis. *Gmel. sib.* 2. p. 125.

Abinthium, tanacetifolio, odoratissimum. *Ann. rath.* 142. t. 193. f. 23. *imperfecte.*